

הדברת אסקוכיטה בתלתן באמצעות התכשירים
טולדו (טבוקונזול) וסקיפר (דיפנוקונזול)

ניסוי במסגרת רישוי התכשירים לשימוש בתלתן
צוות הדרכה מרכז חקלאי העמק



A photograph of a field filled with dense, green, leafy vegetation. In the foreground, a single white flower with a yellow center is visible. The background shows a clear blue sky and some distant trees and structures.

פעולות נחוצות לרישוי במסגרת רישוי לגידולים זעירים:

• יעילות: הקבצות (אסקוויטה בחימצה ובאפונה)-

• בטיחות: מינון מטרה ומינון כפול

• שאריות: (עקום דעיכה). הקבצות?

טיפול

תכשיר	שם גנרי	ח"פ גר"/לי	מינון גר"/ד'
טולדו	tebuconazole	250	75
טולדו	tebuconazole	250	150
סקיפר	difenoconazole	250	50
סקיפר	difenoconazole	250	100




נגיעות קשה




נגיעות התחלתית- מעט כתמים על עלים וגבעולים



מספר פרקים נקיים בראש הצמח




אחוז כיסוי מחלה (הערכה)



התכשירים, טבוקול-
tebuconazole, (פוליקור)
וסקיפר-difenoconazole,
(סקור) הפחיתו באופן מובהק
התפשטות המחלה לאורך ציר
הצמח 11 ו-23 יום אחרי
טיפול

התכשירים טבוקול-
tebuconazole, (פוליקור)
וסקיפר-difenoconazole,
(סקור) הפחיתו באופן מובהק
ההתרחבות כתמי המחלה
(אחוזי כיסוי) 11 ו-23 יום
אחרי טיפול



ולסיכום:

לאחר שהראינו-

1. בצורה מסודרת, בניסוי (עם 5 חזרות, במתכונת אקראיות גמורה, ניתוח שונות לפי טוקי קרמר $P > 0.05$) שהתכשירים **טבוקול וסקיפר** במינוני המטרה יעילים בהדברת המחלה

2. ריסוסים במינון כפול ממינון המטרה לא פוגעים בצמח
נוכל, בשנה הבאה עלינו לטובה לגשת ל-

3. ביצוע עקום דעיכה או אימות שאריות, על מנת לקבל אישור בתווית לשימוש
בתכשירים **טבוקול וסקיפר** להדברת מחלת האסקוכיטה בתלתן

אנו מודים

לישי רימון ולחברת "תפזול" על הרתמם בחפץ לב לביצוע הניסוי
לאורי פילצביץ' ממושב היוגב על האירוח הנעים בחלקה