

כנס גת

"לקראת השקיה"

10.05.2023

מתניה צונץ

נתוני מזרע:

מזרע ארצי של כ- 68,000 דונם (לא סופי!!!);

• 63,000 דונם פימה (כ-2,000 דונם אורגני)

• 3,200 דונם זני מכלוא

• 3,000 דונם ייצור זרעי מכלוא

33,200 דונם- עמק יזרעאל ומשקי המפרץ

35,600 דונם- משקי הדרום, הנגב הצפוני וגרנות

טמפ' נמוכות ואירועי ברד בתחילת העונה





מזיקי קרקע - מיעוט מזיקי קרקע



אגרוטיס



דרן זבלית





כנימות עלה:


- מיעוט כנימות עלה,
חלקות בודדות מאוד
טופלו
- התפתחות אוכלוסיית
אויבים טבעיים

טיפולים לכנימות עלה:

במקרים של נגיעות
קשה, מומלץ
בתוספת שטח
0.1%

- "טיפיקי" 15 גר"/ד'
- "מוספילן" 30 סמ"ק/ד'
- "פלאש" 20 סמ"ק/ד'

* בתכשירים גנריים- לשים לב למינונים!!!







מי שלא אוכל, נאכל...




13/04/2023









אחוז מ- 2021	2022	2023	
139%	186	258	גליל עליון
159%	175	279	אפק
136%	184	250	יזרעאל
146%	220	322	עין חרוד
155%	179	278	גן שומרון
154%	189	292	המעפיל
155%	190	294	רבדים
118%	254	300	קרית גת
168%	171	287	קבוצת יבנה
151%	195	295	נברעם

התחלת הגיחות הינה לאחר צבירה של 270 ימי מעלה, השיא (50%) הוא ב-580 ימי מעלה והסיום הוא לאחר בערך 950 ימי מעלה.

יש לדאוג ליישם את הבלבול בשטח לא יאחר משבועיים לפני הופעת הכפתורים הראשונים. ההמלצה שלנו היא יישום הבלבול בשלב פנולוגי של ארבעה עלים אמיתיים. יש לשים על כך דגש במיוחד שאנחנו יודעים שהבוגרים כבר עלולים להימצא בשטח.

<http://www.cotton.co.il/sites/default/files/%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%99%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5%20130423.pdf>





אל תגידו "לי זה לא יקרה...."


• דיווחים על לכידות

• בצמחי ספיח- כפתורים מפותחים


• התחלת "ראשי סיכה" בחלקות מתקדמות



בלבול- 50 חוטים/דונם (תזכורת...)



ליווי של העובדים בשטח חיוני ליישום מדויק יותר של החוטים ולשיפור יעילות הבלבול. בנוסף, מומלץ לעקוב אחר אוכלוסיית עשי המזיק באמצעות מלכודות בשטח. לכידה של עשים במלכודות מהווה רק אינדיקציה לנוכחות המזיק בשטח.



הליותים

• הסף לטיפול- 2 זחלים מעל 3מ"מ/מטר שורה (עד שבועיים לאחר פרח ראשון);




תכשירים מורשים להדברת הליותים בכותנה

מינון סמ"ק/ד'	מס' קבוצה כימית	חומר פעיל	תכשיר
15 ג'ד'	28	Flubendiamid	טאקומי
20	28	Chlorantraniliprole +	אמפליגו
	3 A	Lambda Cyhalothrin	
30	4 A	Thiamethoxam +	דוריבו
	28	Chlorantraniliprole	
40	22 A	Indoxacarb	אוונט
100	22B	Metaflumizon	אלוורדה
50	5	Spinetoram	ספרטה סופר
40	5	Spinetoram	ארמדה
	18	Methoxyfenozide	
40	6	Emamectin Benzoate	פרוקליים/ נוקאאוט
10 ג'ד'	15	Lufenuron +	דנים
	6	Emamectin Benzoate	
100	15	Lufenuron +	דורנים
	6	Emamectin Benzoate	
20	מנגנון לא ידוע	Pyridalyl	בז
75			פירתרואידים



לכל דבר יש פעם ראשונה....





תודה רבה!!!