


A photograph of a cornfield with tall, green stalks and developing ears of corn. The sky is clear and blue. A green circular graphic with white text is overlaid on the left side of the image.

**סוגיות
בגידול
תירס
2025**

הרהורים בנושאים הבאים :



עיבודי הכנה בדו"ג

קונבנציונלי

סטריפטיל




יעילות בדישון
יעילות בהנבטה
חיסכון אנרגטי

עומד : שורות כפולות

מתוך הניסויים של ליאור



תוצאות – יבול - ניתוח דו גורמי - עומד



עומד (2)

מתוך הניסויים של ליאור



סיכום ומסקנות עד כאן

- שיטת הזריעה ב 4 שורות לערוגה נוסתה בניסויים רבים ותצפיות רבות ולרוב התקבלה תוספת יבול שנעה בין 2% ל 24% מהיבול.
- בשני הניסויים המוצגים כאן הזריעה ב 4 שורות בערוגה הניבה תוספת יבול של 11%-18% (236-312 ק"ג/ד"י).
- תוספת השקיה של 25% לא השפיעה במובהק על היבול באף אחד מהניסויים. בשנה אחת היבול היה גבוה יותר (באופן לא מובהק) עם תוספת ההשקיה ואילו בשנה השנייה לא הייתה תוספת יבול להשקיה העודפת.

זנים : מבחן זנים בגד"ש מניב





מופע התייבשות בזן הטאי

מחלת ההתיבשות ??



הדברת עשבים

- ניסוי חומרים בחולדה - תוצאות ותובנות יוצגו באחד הכנסים הבאים

- קלריס פרו - נכנס ליישום נרחב, רשמים מהשטח :

- מהיר יותר מלאודיס, אפקט דומה

- פגיעה מסויימת בדגניים

- שילוב טומהוק-לאודיס - במינונים מופחתים לא מספיק טוב לירבוזים

- הפעלת מונעי הצצה בטפטוף – האם לוותר עקב יעילות נמוכה?

- חומרים חדשים בקנה : סוקססור(לוקסמבורג) לרחבי עלים

קלאודיוס(גדות) לדגניים




הזנה

➤ בקרה בשיטה הקליפורנית

➤ מה עם קצה הקלח ?

➤ תפקיד הזרחן, יישומי זרחן



המשפיעים על זמינות זרח




זרח על זמינות זרח

שיטת היישום משפיע

בקרקה

התירס?

מרקם קרקע



Olsen P (mg kg⁻¹)



הזנה (2)