

הנחיות לקראת זריעת חיטה - עונת

2026

סתיו רום



מועדי זריעת חיטה

באזורים בהם המשקעים נמוכים מ-350 מ"מ גשם -
מועד הצצה מומלץ בין ה - 15/11 - 25/11

באזורים הגשומים מעל 350 מ"מ גשם -
מועד הצצה מומלץ בין ה - 25/11 - 5/12

לקחת בחשבון 8~ ימים מהרטבה עד שהחיטה בחוץ, תלוי
טמפ'.

אם הקרקע יבשה, להמר/לכוון לפי תחזית גשם צפויה.
הנבטה מוקדמת בהמטרה, אפילים --> בכירים.

סדר זריעה

• נתחיל בזריעת הזנים האפילים ונסיים בזריעת הבכירים.

• חלקות בהם מצע זריעה רגבי או פוטנציאל לשיבוש בעשבים, זריעה לאחר רדת הגשמים לטובת הנבטה עשביה / עיבוד נוסף.

• נכון להתייחס להדברת עשבים עמידים לק"ע



עומק זריעה:

➤ **עומק זריעה מיטבי 1-2 ס"מ**, בכך נבטיח הצצה מהירה אחידה, און צימוח גבוה וסגירה מהירה של השדה.

➤ **זריעה לעומק 4-5 ס"מ**, נזרע רק בחלקות שבהן צפוי נזק מציפורים ובחלקות שבהן נאלצנו לזרוע ברטוב וקיים חשש לנזקים מנמטודות.

מצע

זריעה

בשדות עם קרקע חולית ומתוחחת - יש להנחית את הקרקע ע"י מעגלה או להמתין לגשם ולזרוע ברטוב, על מנת להימנע מזריעה עמוקה מדי.

בשדות בהם רגבים גדולים וקשים - הכנת הקרקע ע"י דיסק ומעגילה, או המתנה לגשם משמעותי ואז קילטור לפרור הרגבים על מנת לאפשר זריעה אופטימלית.

**בזריעת חיטה ע"ג חיטה - תשומת לב לספיח מהעונה שעברה,
מומלץ לזרוע רק לאחר הגשם הראשון המנביט-בואלים של שחת
או קומביין גרעינים נשארים הרבה גרעיני ספיח שיכולים להעלות
את העומד במאות צמחים למ"ר.**



עומד הצמחים

באזורים השחונים פחות מ-250 מ"מ גשם -

נכון ל - 200 צמחים למ"ר

באזורים הגשומים יותר מעל 250 מ"מ גשם -

נכון ל - 250 צמחים למ"ר

דגש להשנה- חישוב מס' זרעים למ"ר

רגב (78)

זן אפיל מאוד, דו תכליתי מצטיין ביבולי גרעינים, תחמיץ ושחת, מתאים לתנאי גידול טובים והנבטות מוקדמות. יבולים גבוהים במיוחד, גרגר מהיר, עמידות מצוינת לרביצה.

קו אשקלון קריית גת דרום | צפון
משקעים נדרשים:
דרום: 100-300 מ"מ | צפון: 350-600 מ"מ
ימי הצצה להשתבלות:
דרום: 95-100 ימים | צפון: 100-105 ימים
יבול גרעינים (ק"ג/דונם):
דרום: 400-500 | צפון ומרכז: 700-950
יבול ח"י טון/ד
דרום: 1-1.1 | צפון: 1.2-1.4

גובה הצמח: 105-120 ס"מ
משקל ל-1000 גרם: 39-41 גרם
עמידות בשדה: 100-120 ימים
חילדון צהוב, עמיד לרביצה
צבע גרגר: בהיר



זרעים למ"ר (אלף מ"ר) *40 270
גרם = 10,800 גרם (11 ק"ג לדונם)

עיטוי זרעים נגד

מזיקים

כנימות עלה - עלולות לגרום נזק ליבול החיטה, מגיעות ב
ההסתעפות כשיש הרבה עלווה.

עיטוי הזרעים ב - "סלסט טופ" בשדות בהם זורעים:

(1) שעורה וחיטת דורום - חובה

(3) זנים אפילים לתחמיץ וכאשר העומד גבוה - מומלץ

המלצות לשדות החשודים בנגיעות בנמטודות


במידה ומתקיימים התנאים הבאים:

מדובר רק בחיטה על גבי חיטה.

במידה ויורד גשם משמעותי מוקדם (בין 15-20 מ"מ).

אז יש לזרוע עמוק בקרקע רטובה להנבטת החיטה תוך 7 ימים מרדת הגשם.

זריעה מאוחרת עלולה לגרום לנזק גדול מאד לחיטה.



עפצי נמטודות

זנים והתאמת מועד הזריעה

➤ אריאל, רותה, איתם, *רגב - זנים אפילים, יזרעו מתחילת נובמבר. רגב מומלץ להנביט החל מ 10/11 מכיוון שידע לרוץ להשתבלות בטמפ' גבוהות.

➤ גדיש, נילי, יוגב - זנים בינוניים עד אפילים, יזרעו לאחר ה-10/11.

➤ גדרה, כיתאין - זנים בינוניים יזרעו החל מאמצע נובמבר.

➤ יובל, עומר, *עמית (חלבון), יעקבי- זנים בכירים ובעלי כושר מילוי גרגר טוב, מתאימים לזריעות מאוחרות.

שעור

ה

- מתאימה במחזור לאחר גידול חיטה.
- הזנים : **מגל (601)**, **שגיב**, **כליל (610)**.
- מועד זריעה אופטימלי - אמצע חודש נובמבר, אם יש עצירת גשמים היא רגישה יותר מחיטה.
- שיעור זריעה - להגיע ל-150 נבטים למ"ר.
- עומק זריעה - 1-2 ס"מ.
- מחלות עלים - רגישות לקמחון. (עמידות לרשת בזנים)
- מזיקים - רגישות לכנימות עלה, חובה לעטות את הזרעים.

קטנית חרפית

- בקיה, תלתן ואפונה (נגב)
- תלתן ואפונה במחצית השנייה של דצמבר, בקיה בתחילת דצמבר.
- דגש על הזדמנות להתמודדות עם עשביה/דגן חורפי קדם זריעה/הצצה, ע"י שימוש בפרופוזאמיד - קרב/מגלן/פרומו (ברישוי רק בתלתן/בקיה) ע"מ לפגוע בדגניים ולא ממשפחת

ACCashe



תודה על ההקשבה

שתהיה לנו שנה גשומה
עם שפע יבולים

שנה טובה

קטניות לשחת

אפונה - יולי (מורגן), בקיה - השדות ופופני, תלתן תבור.

הקטניות יזרעו במחזור לאחר שנתיים או שלוש שנים דגן.

יעוד שטחים: אפונה תזרע בשטחים השוליים יותר ובאזורים השחונים (פחות מ- 300 מ"מ גשם). בקיה ותלתן יזרעו באזורים בהם כמויות הגשם מעל 300 מ"מ.

מועדי זריעה: אפונה ותלתן יזרעו במחצית השנייה של דצמבר. בקיה ניתן לזרוע מתחילת דצמבר (רגישה יותר לטמפ' נמוכות).

שיעור זריעה: אפונה 100 זרעים למ"ר בהתאם למשקל האלף. תלתן 3-3.5 ק"ג/ד'. בקיה השדות - 7 ק"ג/ד. פופני 6 ק"ג/ד.

שילוב בקיה ותלתן - התלתן זקוף והבקיה מטפסת עליו בכך נקטין את סכנת הרביצה ומחלות עלים. בשנים גשומות ניתן

המשך קטניות לשחת

הדברת עשבים: חשוב מאד לזרוע את הקטניות לאחר רדת הגשמים הראשונים שהנביטו עשבים, בכך נבטיח עומק הרטבה במועד ההצצה ואולי נחסוך הדברת עשבים רחבי עלים. אין לחסוך בהדברת עשבים דגניים ההדברה תהיה עם סגירת השורות גם אם אוכלוסיית הדגניים נמוכה. זו ההזדמנות להדביר את כל הדגניים קשי ההדברה (ברומיות, שעורות, בן חיטה) וגם את העמידים בחלקם, ובמחיר זול יחסית.

הזדמנות להשתמש בקרב שהוא מדביר דגנים עמידים למעכבי ACCase.

זני חיטה לתחמיץ לדו גידול

אריאל, רותה, איילון ושוהם - זנים אפילים מאד מתאימים להנבטה ב - 1/11.

גליל, גורן ואג. 14 - זנים אפילים מתאימים להנבטה ב - 5/11.

גדרה, נגב ותשרי - זנים בינוניים מתאימים לדו גידול בהנבטה מאוחרת מאמצע נובמבר.

הזנים: אריאל רותה נגב וגדרה הם דו תכליתיים, מתאימים גם לשיווק לתחנות הקמח.

שבולת שועל לשחת

- ▶ הזנים : סאיה 4, סאיה 6 - אפילה יותר.
- ▶ מועדי זריעה - אמצע חודש נובמבר.
- ▶ שיעור זריעה - 5-6 ק"ג/ד.
- ▶ עומק זריעה - 2-3 ס"מ.