

המצב בשדות

חיטה ושעורה
תלתן
חימצה
קינואה

חיטה ושעורה

• **מצב הזריעה:** המגדלים בנגב ובמשקי הדרום בסיומה של הזריעה.

• **גשם:** שני אירועים ב-15/11 וב-25/11.

במשקי דרום ומשקי הנגב: 30-60 מ"מ. מלבד: **שני אזורים!!!!**

• **שדות מושקים:**

• בנגב עשרות אלפי דונם כבר נבטו וחלקם עם 5-6 עלים לאחר הדברת עשבים.

• במשקי דרום הנביטו מעט שדות והם בגיל 3-4 עלים לקראת הדברת עשבים.

• **דישון ראש:** לשקול מתן דשן בשדות מושקים על כרב עני בחנקן כמו בוטנים,

חמניות וחיטה, באזורים שבהם ירדו יותר מ-50 מ"מ גשם בקרקעות הקלות.

• נמטודות – לא ניצפו נזקים, שדות אלו ברובם נזרעו מוקדם.

מים וחנקן מחפים על הטמפי'
הגבוהות ששררו בנובמבר



צמח מייצג מחלקה

שהונבטה ב-10/11



חיטה ושעורה

- נכון להיום שימוש נרחב באלבר מ' 100-120 סמ"ק/ד', כאשר החיטה והשעורה יגיעו ל-6 עלים כדאי לעבור לאמינובר ודומיו עד לשלב ההשתבלות.
- ספטוריה – במידה וימשכו הגשמים יש לבדוק המצאות המחלה בחיטה.

מכרסמים:

מריונים - סף לטיפול 3 חורים לד',
נברנים - 10 מחילות לד'.



תלתן

• זה המועד לזריעה:

• ריסוס ראונדאפ + אור.

• קילטור להשמדת עשבים והעלאת הרטיבות או זריעה באפס עיבוד.


• זריעה ברטוב להנבטה.

• הדברת עשבים: בגיל 2-3 עלים אמיתיים קרב 150+בזגראן 250.

חימצה

- המועד מתאים לזריעה בבעל לאחר הגשם:
- ריסוס ראונדאפ + אור
- קילטור להשמדת עשבים והעלאת הרטיבות.
- זריעה לעומק 4-5 ס"מ ברטוב להנבטה, 15 זרעים למטר שורה.
- חימצה בהשקיה – מומלץ לזרוע בסוף ינואר.
- אסקוכיטה ????

קינואה



- מועד מתאים לזריעה לאחר הגשם:

- ריסוס ראונדאפ + אור

- דישון 20 ק"ג/ד אוראה

- קילטור להשמדת עשבים והצנעת הדשן.

- זריעה לעומק 1-2 ס"מ ברטוב להנבטה,

- 100 זרעים למטר מרובע.



בתקווה להמשך הגשמים
שתהיה שנה מוצלחת