



נספח ד'

תכשירי הדברה מורשים לשימוש בעגבניות לתעשייה: עונת 2026

מהדורה 23

תאריך עדכון: 9.12.25

- ברשימה זו מובאים בפניכם תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בעגבניות תעשייה במדינת ישראל, הרשימה אינה מהווה המלצה להשתמש בתכשירים הנ"ל.
- השימוש בתכשירי ההדברה כפוף לרשום בתווית המצורפת לאריזתם, חלה חובה על המגדל לפעול בהתאם לתקנות התווית - תקנות הגנת הצומח (קיום הוראת תווית האריזה), התשל"ז-1977, בכל מקרה של אי התאמה בין הרשום ברשימה זו לבין תווית הרישוי יש להתייחס לרשום בתווית.
- השימוש בתכשירים אלו ליעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל עלול להוביל לחריגה ברמת השאריות ונדרשת התאמה של ימי ההמתנה של תכשירים אלו בשימוש בתוצרת המיועדת ליצוא. התאמת ימי ההמתנה של תכשירים הינה באחריותו של המגדל/יצואן.
- תכשירים המאושרים גם לחקלאות אורגנית מסומנים בירוק.
- כאשר מצויין בתווית תכשיר מינון בכמות לדונם או בריכוז, יש להשתמש בכמות לדונם בנפחי ריסוס נמוכים, ובריכוז בנפחי ריסוס שמעל 100 ליטר לדונם.

[מידע נוסף על התכשירים ניתן לקבל באתר משרד החקלאות – השרותים להגנת הצומח: https://pesticides.moag.gov.il/#/pages/tachshirim](https://pesticides.moag.gov.il/#/pages/tachshirim)

בעמודות השאריות: * = גבול כימות מכשירי המעבדה, D = ברירת המחדל שנקבעה ע"י המדינה בהיעדר שארית אחרת, **פסור** = אין מגבלת שאריות
רקע ירוק = השארית זהה או גבוהה מזו של ישראל, **רקע אדום** = השארית נמוכה מזו של ישראל, **רקע צהוב** = אחר.

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
אגרוטיס <i>Agrotis</i> sp.											
1.4	0.6	0.6	0.05		יישום אחד בעונה	3	15 סמ"ק	תפוזל גדות אגרו	28	CHLORANTRANILIPROLE	אודין ת"ר קורגן ת"ר
1.4	0.6	0.6	0.05			3	20 סמ"ק	אדמה מכתשים	28 3A	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	אמפליגו שת"ר
0.1 (6-dry or wet pomace)	0.07	0.07	0.1	א. אירופי, אנגליה							
	0.01D	0.01D	פטור			3	1.5 - 2 ק"ג 1-1.5 ק"ג	רימי	לא מסווג	SODIUM FLUOSILICATE	ספסן 515 פ"ג ספסן 1015 פ"ג
אקרית אדומה מצויה <i>Tetranychus urticae</i>											
0.07	0.09	0.015	0.02	א. אירופי	מינון מדויק, ראה בתווית. בשילוב עם שמן מינרלי או עם משטח.	3	50-60 סמ"ק	כ.צ.ט.	6	ABAMECTIN	אגרירון ת"מ
								אדמה מכתשים			אינוורט ת"ש
								אגרימור			אקטינמור ת"מ
								עמיר שיווק			אקרימקטין ת"מ
								תפוזל			ביומקטין ת"מ
								גדות אגרו			בקטין ת"מ
								תרסיס			ורטיגו ת"מ
								אדמה אגן			ורטימק ת"מ
								אגרימור			ורמוט ת"מ
								גדות אגרו			ורקוטל ת"מ
0.45 (0.8-paste)	1	1	1	ארה"ב	ניתן לשלב עם ביסקיה	3	60 סמ"ק 60-100 סמ"ק	לידור דור.קי	23	SPIROMESIFEN	אוברון ת"ר אובליסק תש"מ
פטור	פטור	פטור	פטור			3	1%	ביו-יום אדמה מכתשים	מבני/פיזי	MINERAL OIL	אובי ת"מ E.O.S שמן
פטור	0.01D	0.01D	פטור		בשילוב מילבנוק	3	1%	אדמה אגן	לא מסווג	SUCROGLYCERIDES	אנדיבאג ת"מ
	0.3	0.3	1	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	40 סמ"ק	אדמה מכתשים	10A	CLOFENTEZINE	אפולו 50 ת"ר
			פטור			3	0.07% 0.08%	תפוזל אדמה אגן	לא מסווג	MODIFIED POLYALKYLENEOXIDE HEPTAMETHYLTRISILOXANE	אקו-טק ת"נ מייטוואט ת"נ
0.7	0.2	0.3	0.7	א. אירופי, אנגליה		3	150 סמ"ק	רימי	20B	ACEQUINOCYL	אקסמייט ת"ר
4	0.5	0.01	0.05	א. אירופי		3	50 סמ"ק	דור.קי תפוזל גדות אגרו תרסיס	20D	BIFENAZATE	דורמייט תש"מ פלוטו ת"ר פלורמייט ת"ר פרדיסו ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב								
				המשך: אקרית אדומה מצויה <i>Tetranychus urticae</i>							
0.7	0.4	0.4	0.1			3	100 סמ"ק	אדמה אגן	25A	CYFLUMETOFEN	דפנדר ת"ר
0.2	0.07	*0.01	0.02	א. אירופי		3	25 סמ"ק	תפזול	10B	ETOXAZOLE	טופ-מייט ת"ר
								אדמה אגן			ספידר ת"ר
0.3	0.5	0.05	0.1	א. אירופי		7	100 - 75 סמ"ק	אגריכס	C1	FENAZAQUIN	מגיסטר ת"ר
0.2	0.3	0.3	0.05			7	100 סמ"ק	אדמה מכתשים	21A	FENPYROXIMATE	מטאור ת"ר
	0.01D	0.01D	0.02	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	50 - 40 סמ"ק	רימי	21A	PYRIMIDIFEN	מייטקלין ת"ר
	0.02*	0.02*	0.05	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	בשילוב EOS בריכוז 1%	3	100 סמ"ק	אדמה אגן	6	MILBEMECTIN	מילבנוק ת"מ
	0.8	0.8	0.05	ארה"ב		7	75 גרם	כ.צ.ט	21A	TEBUFENPYRAD	מסאי-מייט א"ר
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	1%	אגרימור	לא ידוע	NEEM OIL	נגב ת"מ
								אגרימור			נים-בי ת"מ
								אדמה מכתשים			נימגארד שמן
0.15	0.15	0.15	0.2	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		14	250 סמ"ק	גדות אגרו	21A	PYRIDABEN	נקסטר 10 ת"ר
פטור	פטור	פטור	פטור			3	1%	לוכסמבורג	לא ידוע	FATTY ACID POTASSIUM SALT	פליפר ת"ש
	פטור	פטור	פטור			3	3%	שלף	לא ידוע	PLANT OIL	תמר טק תח'
				אקרית החלודה <i>Vasates lycopersici</i>							
0.07	0.09	0.015	0.02	א. אירופי	בשילוב עם שמן מינרלי או עם משטח.	3	50 סמ"ק	כ.צ.ט	6	ABAMECTIN	אגרירון ת"מ
								עמיר שיווק			אקרימקטין ת"מ
								תפזול			ביומקטין ת"מ
								גדות אגרו			בקטין ת"מ
								תרסיס			ורטיגו ת"מ
								אדמה אגן			ורטימק ת"מ
								גדות אגרו			ורקוטל ת"מ
0.45 (0.8-paste)	1	1	1	ארה"ב	ניתן לשלב עם ביסקיה	3	60 סמ"ק	לידור	23	SPIROMESIFEN	אוברון ת"ר
פטור	1	1	פטור		בשילוב שמן דימול 1%	3	30 - 60 סמ"ק	גדות אגרו	לא ידוע	AZADIRACTIN	איזידור ת"מ
2.5 (mancozeb)	2	*0.05	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		7	250 גרם	לידור	רב אתרי	PROPINEB	אנטרקול א"ר
5	0.01*	0.01*	5	א. אירופי, אנגליה	טיפול מניעה במרווח 7-10 ימים	3	200 סמ"ק	אדמה אגן	רב אתרי	CHLOROTHALONIL	בראבו 720 ת"ר
								תפזול			ברק ת"ר
	0.01D	0.01D	פטור פטור		בתוספת משטח אגוז 0.4%	3	1%	דע-קדם	לא ידוע לא ידוע	CANOLA OIL + NEEM OIL	גניקן ת"מ

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב								
				המשך: אקרית החלודה <i>Vasates lycopersici</i>							
פטור	פטור	פטור	פטור			3	4 - 3 ק"ג	אדמה מכתשים	רב אתרי	SULFUR	גפרביק 70 אב'
							400 גרם	כ.צ.ט			קומולוס ג"ר
							300 גרם	אדמה מכתשים			תיוביט ג"ר
0.7	0.4	0.4	0.1		ניתן לשלב עם EOS במינון 1%	3	100 סמ"ק	אדמה אגן	25A	CYFLUMETOFEN	דפנדר ת"ר
2.5	3	3 (2 מ-8.25)	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	עד 4 ריסוסים בעונה	5	250 גרם	גדות אגרו	רב אתרי	MANCOZEB	טרידקס גרגרי
								לוכסמבורג			מנקו די ג"ר
								לוכסמבורג			מנקוזן א"ר
								גדות אגרו			מנקוטל א"ר
								אגריכס			סנקוזב ג"ר
								אגריכס			סנקוזב א"ר
7											
0.3	0.5	0.05	0.1	א. אירופי		7	75-100 סמ"ק	אגריכס	C1	FENAZAQUIN	מגיסטר ת"ר
	0.01D	0.01D	0.02	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	40 סמ"ק	רימי	21A	PYRIMIDIFEN	מייטקלין ת"ר
0.2	0.3	0.3	0.05			7	100 סמ"ק	אדמה מכתשים	21A	FENPYROXIMATE	מטאור ת"ר
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01			7	40 סמ"ק	אדמה אגן	6	EMAMECTIN BENZOATE	פרוקליים ת"מ
								תפזול			פרפקט ת"מ
				הליותיס (תנשמית) <i>Helicoverpa spp.</i>							
1.4	0.6	0.6	0.05			3	20 סמ"ק	תפזול	28	CHLORANTRANILIPROLE	אודין ת"ר
					בשילוב ביו-פילם.			גדות אגרו			קורגן ת"ר
								תרסיס			קורנס 200 ת"ר
0.5	0.5	0.01	0.2	א. אירופי	מוגבל ל 2 רסוסים עוקבים.	7	30 - 45 סמ"ק	גדות אגרו	22A	INDOXACARB	אוואנט ת"מ
0.3	0.3	0.3	0.2		הליותיס עד 15 מ"מ	7	50 סמ"ק	תפזול	3A	BIFENTHRIN	אטלס ת"מ
								לוכסמבורג			טלסטאר ת"מ
								תרסיס			סטרטר ת"מ
0.6 (1.2-paste)	0.6	0.7	0.3			3	100 סמ"ק	כ.צ.ט	22B	METAFLUMIZONE	אלוורדה ת"ר
1.4 0.1 (6-dry or wet pomace)	0.6	0.6	0.05	א. אירופי, אנגליה		3	20 סמ"ק	אדמה מכתשים	28 3A	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	אמפליגו שת"ר
	0.07	0.07	0.1								
1.5 0.02 (0.15-paste)	1.5	1.5	0.5			14	50 סמ"ק	תפזול	15 6	TEFLUBENZURON + EMAMECTIN BENZOATE	אקזיט ת"ר
0.02	0.02	0.02	0.01								
2 0.4	2	0.6	0.5			14	40 סמ"ק	אגריכס	18 5	METHOXYFENOZIDE + SPINETORAM	ארמדה ת"ר
0.4	0.5	0.06	0.01								

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
המשך: <u>הליותיס</u> (תנשמית) <i>Helicoverpa spp.</i>											
0.2 (0.5-paste, 5-dry or wet pomace)	0.05	0.2	0.5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		14	100 סמ"ק	לידור	3A	CYFLUTHRIN	באיטרואיד ת"מ
1	1	1.5	0.2			3	20 סמ"ק	אדמה אגן	לא ידוע	PYRIDALYL	בז ת"מ
0.25 (0.8-paste)	0.7	0.2 (0.01 מ-7.3.26)	0.02	א. אירופי, החל מ-7.3.26	עד 2 ריסוסים בעונה	3	30 סמ"ק	אדמה אגן	4A 28	THIAMETHOXAM + CHLORANTRANILIPROLE	דוריבו ת"ר
1.4	0.6	0.6	0.05								
	0.4	0.4	0.2	ארה"ב		3	100 סמ"ק	דור.קי	15	LUFENURON + EMAMECTIN BENZOATE	דורנים ת"ש
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01				10 גרם	אדמה מכתשים	6		דנים פיס ג"ר
0.2 (1-paste, puree)	0.07	0.1	0.2	א. אירופי, אנגליה		14	0.0125-0.025%	גדות אגרו	3A	DELTAMETHRIN	דסיס אקספרט ת"מ
0.6	0.2	2	0.3	אנגליה.		5	15 סמ"ק	אדמה מכתשים	28	FLUBENDIAMIDE	טאקומי ג"ר
2	2	0.6	0.5								
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01			7	75 סמ"ק	תפוזל	18 6	METHOXYFENOZIDE + EMAMECTIN BENZOATE	מטרופולין ת"ר
0.4	0.5	0.06	0.01			3	50 סמ"ק	אגריכס	5	SPINETORAM	ספרטה סופר ת"ר
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	150-100 גרם	אדמה מכתשים	11A	<i>Bacillus thuringiensis</i>	פרוביט ג"ר
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01			7	40 סמ"ק	אגרולב	6	EMAMECTIN BENZOATE	פוקר ת"מ
								כ.צ.ט			פרוקיל 19.2 ת"מ
								אדמה אגן			פרוקליים ת"מ
								תפוזל			פרפקט ת"מ
	0.5	*0.01	0.05	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב.		14	200 סמ"ק	לידור	4A 3A	THIACLOPRID + DELTAMETHRIN	פרותיאוס תש"מ
0.2 (1-paste, puree)	0.07	0.1	0.2								
0.3	0.3	0.3	0.2	א. אירופי		4	150 סמ"ק	אדמה מכתשים	3A 15	BIFENTHRIN + NOVALURON	רימון פאסט ת"ר
2	1	*0.01	0.1								
טוטה אבסולוטה <i>Tuta absoluta</i>											
0.2 (0.4-paste)	0.5	0.06	0.2	א. אירופי		7	30 סמ"ק	אדמה אגן	4A 6	ACETAMIPRID + EMAMECTIN BENZOATE	אוברטופ ת"פ
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01								
1.4	0.6	0.6	0.05		בשילוב ביו-פילם.	3	20 סמ"ק	תפוזל	28	CHLORANTRANILIPROLE	אודין ת"ר
								גדות אגרו			קורגן ת"ר
								תרסיס			קורנס 200 ת"ר
0.5	0.5	*0.01	0.2	א. אירופי	מוגבל ל 2 רסוסים עוקבים.	7	30 - 45 סמ"ק	גדות אגרו	22A	INDOXACARB	אוואנט ת"מ
0.6 (1.2-paste)	0.6	0.7	0.3			3	100 סמ"ק	כ.צ.ט	22B	METAFLUMIZONE	אלוורדה ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
				המשך: <u>טוטה אבסולוטה</u> <i>Tuta absoluta</i>							
1.4	0.6	0.6	0.05	א. אירופי, אנגליה	בשילוב מטרונום פריים או EOS.	3	20 סמ"ק	אדמה מכתשים	28 3A	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	אמפליגו שת"ר
0.1 (6-dry or wet pomace)	0.07	0.07	0.1								
1	1	1.5	0.2			3	30 סמ"ק	אדמה אגן	לא ידוע	PYRIDALYL	בז ת"מ
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	250 סמ"ק	ביו דליה	11A	<i>Bacillus thuringiensis</i>	ביו-טי פלוס ת"ר
							125 גרם	כ.צ.ט			דיפל DF ג"ר
0.25 (0.8-paste)	0.7	0.2 (0.01 מ- 7.3.26)	0.02	א. אירופי, החל מ- 7.3.26	עד 2 ריסוסים בעונה	3	30 סמ"ק	אדמה אגן	4A 28	THIAMETHOXAM + CHLORANTRANILIPROLE	דוריבו ת"ר
1.4	0.6	0.6	0.05								
	0.4	0.4	0.2	ארה"ב		3	10 גרם	אדמה מכתשים	15 6	LUFENURON + EMAMECTIN BENZOATE	דנים פיט ג"ר
	0.02	0.02	0.01								
0.07	0.09	0.015	0.02	א. אירופי		3	100 סמ"ק	אדמה מכתשים	6 28	ABAMECTIN + CHLORANTRANILIPROLE	ווליאם טרגו ת"ר
1.4	0.6	0.6	0.05								
2	1	1	0.2		בהגמעה	3	40 סמ"ק	גדות אגרו	28	CYANTRANILIPROLE	ורימרק ת"ר
0.6	0.2	2	0.3	אנגליה		5	25 גרם	אדמה מכתשים	28	FLUBENDIAMIDE	טאקומי ג"ר
	0.02*	0.02*	0.05	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	בשילוב EOS בריכוז 1%	3	0.1%	אדמה אגן	6	MILBEMECTIN	מילבנוק ת"מ
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01		לא יותר משני רסוסים עוקבים	7	40 סמ"ק	תרסיס	6	EMAMECTIN BENZOATE	נוקאאוט ת"מ
								אגרולב			פוקר ת"מ
								כ.צ.ט			פרוקיל 19.2 ת"מ
								אדמה אגן			פרוקליים ת"מ
								תפזול			פרפקט ת"מ
0.4	0.5	0.06	0.01			3	60 סמ"ק	אגריכס	5	SPINETORAM	ספרטה סופר ת"ר
פטור	1	1	פטור			3	0.125-0.25%	לוקסמבורג	לא ידוע	AZADIRACHTIN	נימזל ת"מ
					בשילוב תותח 0.5%		0.3%	דע-קדם			עזגן א"ר
2	1	*0.01	0.2	א. אירופי	בתוספת 1% EOS	4	100 סמ"ק	אדמה מכתשים	15	NOVALURON	רימון 10 ת"מ
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	0.5%	דע-קדם	לא ידוע 3A	NEEM OIL + PYRETHRINS	תותח ת"מ
פטור	1	1	פטור								
				כנימה קמחית מנוקדת <i>Phenacoccus solenopsis</i>							
0.7 (1.2-puree, 2.6-paste)	0.3	0.3	0.1		בשילוב שטח 90 0.1%	7	0.03%	אגריכס	4C	SULFOXAFLOX	פלאש ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב	כנימות עלה Aphids							
0.3	0.3	0.3	0.2			7	75 סמ"ק	תפוזל	3A	BIFENTHRIN	אטלס ת"מ
פטור	פטור	פטור	פטור			3	0.1 - 0.2%	רימי	לא ידוע	Beauveria bassiana	ביווריה ת"ר
פטור	פטור	פטור	פטור		בשילוב 0.1% משטח אגוז	3	0.8%	דע-קדם	לא מסווג	POTASSIUM SALT OF FATTY ACIDS	כנימת ת"נ
1	0.01*	0.01*	1	א. אירופי, אנגליה		3	200 - 350 סמ"ק	גדות אגרו	1A	METHOMYL	לאנט 20 ת"נ
							50 - 75 גרם	גדות אגרו			לאנט 90 א"מ
8	0.02*	0.02*	3	א. אירופי, אנגליה		3	200 סמ"ק	תרסיס	1B	MALATHION	מלתיון ת"מ
פטור	1	1	פטור		יש לרסס בשעות הערב	3	0.1%	אדמה מכתשים	לא ידוע	AZADIRACTIN	נימיקס 45 ת"מ
								דע-קדם			עזגן א"ר
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	1%	דע-קדם	לא ידוע	NEEM OIL + PYRETHRINS	נימפר ת"מ
פטור	1	1	פטור				0.4%	דע-קדם	3A		תותח ת"מ
1 (3-puree, 6-paste)	0.5	0.3	3	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	היישום בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה, לא יותר משני טיפולים בעונה	3	40 סמ"ק	דור.קי	4A	IMIDACLOPRID	סייפן ת"ר
								תפוזל			קודקוד ת"ר
								אדמה מכתשים			קוהינור 350 ת"ר
								לידור			קונפידור ת"ר
								תרסיס			קונפידנס ת"ר
	0.5	0.5	1	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	60 גרם	אדמה מכתשים	1A	PIRIMICARB	פירימור ג"ר
				כנימת עש הטבק Bemisia tabaci							
0.45 (0.8-paste)	1	1	1	ארה"ב		3	60 - 120 סמ"ק	דור.קי	3A	SPIROMESIFEN	אובליסק תש"מ
0.2 (0.4-paste)	0.5	0.06	0.2	א. אירופי		7	30 סמ"ק	אדמה אגן	4A 6	ACETAMIPRID + EMAMECTIN BENZOATE	אוברטופ ת"פ
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01								
	0.01D	0.01D	0.05	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		14	70 - 100 גרם	גדות אגרו	14	THIOCYCLAM	אויסקט-S א"מ
0.7 (1-paste)	0.01D	0.01D	0.05	א. אירופי, אנגליה		6	75 גרם	תפוזל	4A	DINOTEFURAN	אייקון ת"מ
						3		רימי			איפון ג"מ
								תרסיס			סומו תש"מ
2	0.01*	0.01*	0.3	א. אירופי, אנגליה	להדברת הזחלים	3	150 סמ"ק	אדמה מכתשים	16	BUPROFEZIN	אפלורד ת"ר
0.3	0.3	0.3	0.2	א. אירופי		4	250 סמ"ק	אדמה אגן	3A	BIFENTHRIN + ACETAMIPRID	אצטאסטאר ת"מ
0.2 (0.4-paste)	0.5	0.06	0.2						4A		
			פטור			3	0.07%	תפוזל	לא מסווג	POLYALKYLENEOXIDE MODIFIED HEPTAMETHYLTRISILOXAN	אקו-טק ת"נ

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב	המשך: <u>כנימת עש הטבק</u> <i>Bemisia tabaci</i>							
0.02	0.2 (0.01 מ-7.3.26)	0.7	0.25 (0.8-paste)	א. אירופי, החל מ-7.3.26	בהגמעה.	3	60 סמ"ק	אדמה אגן	4A	THIAMETHOXAM	אקטרה ת"ר
פטור	פטור	פטור	פטור			3	0.1 - 0.2%	רימי	לא ידוע	<i>Beauveria bassiana</i>	ביווריה ת"ר
0.05	*0.01	0.5		א. אירופי, ארה"ב.		3	80 סמ"ק	לידור	4A	THIACLOPRID	ביסקיה 240 תש"מ
							40 סמ"ק	תפוזל			קלימרה ת"ר
0.2	0.06	0.5	0.2 (0.4-paste)	א. אירופי, ארה"ב		7	60 סמ"ק	דור.קי	4A 23	ACETAMIPRID + SPIROMESIFEN	דאבל פס ת"ר
0.2 (1-paste, puree)	0.1	0.07	0.45 (0.8-paste)	א. אירופי, אנגליה		14	0.0125-0.025%	גדות אגרו	3A	DELTAMETHRIN	דסיס אקספרט ת"מ
0.1	0.01D	0.15	0.2 (0.5-dried)	א. אירופי	עד 3 יישומים בעונה	3	75 - 50 סמ"ק	לוכסמבורג	9D	AFIDOPYRIOPIEN	ורסיס ת"פ
3	0.3	0.5	1 (3-puree 6-paste)	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	75 סמ"ק	לוכסמבורג	4A 3A	IMIDACLOPRID + GAMMA-CYHALOTHRIN	טוטס שת"ר
0.1 (6-dry or wet pomace)	0.07	0.07									
0.5	0.5	0.5		ארה"ב	הדברת בוגרי כנימת עש הטבק, למניעת העברת וירוס צהבון האמיר	14	0.15%	לוכסמבורג אדמה מכתשים רימי תרסיס	3A	CYPERMETHRIN	טיטאן 20 ת"מ סימשופר ת"מ סיפרין 20 ת"מ תרסיס ת"מ סימבוש ת"מ סיפרין 10 ת"מ
							0.3%	אדמה מכתשים רימי			
0.2	0.3	0.3	0.3		למניעת וירוס צהבון האמיר	7	0.15%	לוכסמבורג	3A	BIFENTHRIN	טלסטאר ת"מ
0.2	0.5	0.06	0.2	א. אירופי	עד 2 יישומים בעונה	7	30 סמ"ק	אדמה אגן	4A	ACETAMIPRID + PYRIPROXYFEN	טריבור ת"פ
0.8	1	0.7							7C		
0.05	1	2	2.5		עד 2 יישומים בעונה	3	50 סמ"ק	לידור	23	SPIROTETRAMAT	מובנטו 100 ת"ר
0.2	0.06	0.5	0.2 (0.4-paste)	א. אירופי		7	30 סמ"ק	אדמה אגן כ.צ.ט. תפוזל	4A	ACETAMIPRID	מוספילן לרסוס ת"נ מוסקיטון ת"נ מפיסטו ת"נ
0.2	1	1	2		עד 2 יישומים בעונה במרווח 7 ימים לפחות	3	75 סמ"ק	אדמה אגן	28 משרה עמידות	CYANTRANILIPROLE + ACIBENZOLAR-S-METHYL	מינקטו אלפא ת"ר
0.05	0.3	0.3	1 (3-paste)								
פטור	1	1	פטור		יש לרסס בשעות הערב	3	0.25%	לוכסמבורג	לא ידוע	AZADIRACHTIN	נימזל ת"מ
							0.1%	אדמה מכתשים דע-קדם			נימיקס 45 ת"מ עזגן א"ר
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	1%	דע-קדם	לא ידוע 3A	NEEM OIL + PYRETHRINS	נימפר ת"מ
פטור	1	1	פטור								

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב	נמוכה מזו של ישראל							
המשך: <u>כנימת עש הטבק</u> <i>Bemisia tabaci</i>											
0.3 (DFA-0.02)	0.7 (DFA-0.4)	0.7 (DFA-0.4) מ-26.11.25	1.5			3	75 סמ"ק	לידור	4D	FLUPYRADIFURONE	סיבנטו פריים ת"י
3	0.3	0.5	1 (3-puree, 6-paste)	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	היישום בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה, לא יותר משני טיפולים בעונה	3	100 סמ"ק	דור.קי	4A	IMIDACLOPRID	סייפן ת"ר
								תפוזל			קודקוד ת"ר
								אדמה מכתשים			קוהינור 350 ת"ר
								לידור			קונפידור ת"ר
								תרסיס			קונפידנס ת"ר
פטור	פטור	פטור	פטור			3	1% - 0.5%	לוכסמבורג	לא מסווג	FATTY ACID POTASSIUM SALT	פליפר ת"ש
לפיגמה <i>Spodoptera exigua</i>											
0.2	*0.01	0.5	0.5	א. אירופי	מוגבל ל 2 רסוסים עוקבים.	7	30 - 45 סמ"ק	גדות אגרו	22A	INDOXACARB	אוואנט ת"מ
0.3	0.7	0.6 (1.2-paste)	0.6			3	100 סמ"ק	כ.צ.ט	22B	METAFLUMIZONE	אלוורדה ת"ר
0.5	1.5	1.5	1.5			14	50 סמ"ק	תפוזל	15 6	TEFLUBENZURON + EMAMECTIN BENZOATE	אקזיט ת"ר
0.01	0.02	0.02 (0.15-paste)	0.02			3	20 סמ"ק	אדמה אגן	לא ידוע	PYRIDALYL	בז ת"מ
0.2	0.4	0.4	0.4	ארה"ב		3	10 גרם	אדמה מכתשים	15 6	LUFENURON + EMAMECTIN BENZOATE	דנים פיט ג"ר
0.2	0.4	0.4	0.4	ארה"ב		14	40 סמ"ק	דור.קי	15	LUFENURON	מאצ'ו 50 ת"ש
								כ.צ.ט			מירון 50 ת"מ
								אדמה אגן			מץ' ת"מ
								אגרולב			מצדה ת"מ
								תפוזל			צבר ת"מ
0.5	0.6	2	2			7	75 סמ"ק	תפוזל	18 6	METHOXYFENOZIDE + EMAMECTIN BENZOATE	מטרופולין ת"ר
0.01	0.02	0.02 (0.15-paste)	0.02			7	50 סמ"ק	תרסיס	3A	BIFENTHRIN	סטרטר ת"מ
פטור	0.01D	0.01D	0.01D				1.5 - 2 ק"ג	רימי	לא מסווג	SODIUM FLUOSILICATE	ספסן 515 פ"ג
							2 - 1.5 ק"ג				ספסן 1015 פ"ג
0.05	0.6	0.6	1.4			3	20 סמ"ק	תרסיס	28	CHLORANTRANILIPROLE	קורנס 200 ת"ר
0.2	*0.01	1	2	א. אירופי		4	50 סמ"ק	אדמה מכתשים	15	NOVALURON	רימון 10 ת"מ

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר	
ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב									
				מנהרנים <i>Liriomyza</i> spp.								
0.07	0.09	0.015	0.02	א. אירופי	בשילוב עם שמן.	3	60 סמ"ק	כ.צ.ט	6	ABAMECTIN	אגרירון ת"מ	
								עמיר שיווק			אקרימקטין ת"מ	
								תפזול			ביומקטין ת"מ	
								תרסיס			ורטיגו ת"מ	
								אדמה אגן			ורטימק ת"מ	
								גדות אגרו			ורקוטל ת"מ	
	0.01D	0.01D	0.05	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		14	70 - 100 גרם	גדות אגרו	14	THIOCYCLAM	אויסקט-S א"מ	
1.4	0.6	0.6	0.05	א. אירופי, אנגליה	מומלץ לשלב עם מטרונום פריים 0.5%	3	20 סמ"ק	אדמה מכתשים	28 3A	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	אמפליגו שת"ר	
0.1 (6-dry or wet pomace)	0.07	0.07	0.1									
1	0.6	*0.01	0.5	א. אירופי		3	25 גרם	תרסיס	17	CYROMAZINE	טופגארד א"ר	
								תפזול			טרופר א"ר	
								אדמה מכתשים			טריגרד 75 א"ר	
0.4	0.7	0.7	0.05		בתוספת שמן וירותר 1%	3	80 סמ"ק	אגריכס	5	SPINOSAD	טרייסר אולטרה	
	0.02*	0.02*	0.05	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	בשילוב EOS בריכוז 1%	3	0.1%	אדמה אגן	6	MILBEMECTIN	מילבנוק ת"מ	
				נמטודות יוצרות עפצים <i>Meloidogyne</i> spp.								
	פטור	פטור	פטור	א. אירופי	היישום באמצעות מערכת הטפטוף, בהגמעה או בהצנעה, על-פי הוראות השימוש המפורטות בתוויות	3	400 סמ"ק	ביו-יום	לא ידוע	GARLIC EXTRACT	ביוגארד 100 ת"נ	
1	0.9	0.5	0.35				3	130 סמ"ק	לידור	C2	FLUOPYRAM	וולום פריים 400 ת"ר
2	0.01*	*0.002	0.01			א. אירופי	21	0.5 ליטר	תרסיס	1A	OXAMYL	ויוה ת"נ
								1 ליטר	גדות אגרו			וידט 10 ת"נ
0.07	0.09	0.015	0.02			א. אירופי	3	600 סמ"ק	אדמה אגן	6	ABAMECTIN	טרוויגו ת"ר
							3	250 סמ"ק	תפזול			נמטוקס ת"ר
			פטור				3	1000 סמ"ק	אדמה מכתשים	לא ידוע	CARVACROL	נמקיל תח'
0.7 (1.5-paste)	0.01D	0.01D	0.3			א. אירופי, אנגליה	75	800 סמ"ק	אדמה מכתשים	לא מסווג	FLUENSULFONE	נימיץ ת"מ
	0.01D	0.01D	פטור				3	1 ליטר	אגרולב	לא מסווג	THYME OIL	פרומקס ת"נ
						עש הפקעות (עשבננין הבולבוסים) <i>Phthorimaea perculella</i>						
0.5	0.5	0.01	0.2	א. אירופי	מוגבל ל 2 רסוסים עוקבים.	7	30 - 45 סמ"ק	גדות אגרו	22A	INDOXACARB	אוואנט ת"מ	
0.3	0.3	0.3	0.2			7	75 סמ"ק	לוכסמבורג	3A	BIFENTHRIN	טלסטאר ת"מ	
								תרסיס			סטרטר ת"מ	
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01			7	40 סמ"ק	אדמה אגן	6	EMAMECTIN BENZOATE	פרוקליים ת"מ	
								תפזול			פרפקט ת"מ	
1.5	1.5	1.5	0.5			14	50 סמ"ק	תפזול	15	TEFLUBENZURON	שונית ת"ר	

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב	<u>פלוסיה Autographa gamma</u>							
0.05	0.6	0.6	1.4			3	20 סמ"ק	תפוזל גדות אגרו	28	CHLORANTRANILIPROLE	אודין ת"ר קורגן ת"ר
0.2	0.01	0.5	0.5	א. אירופי	מוגבל ל- 2 רסוסים עוקבים.	7	30 - 45 סמ"ק	גדות אגרו	22A	INDOXACARB	אוואנט ת"מ
0.2	0.01D	0.01D		א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		15	75 - 100 סמ"ק	לוכסמבורג	15	CHLORFLUAZURON	אטברון ת"מ
0.2	0.3	0.3	0.3			7	50 סמ"ק	תפוזל לוכסמבורג תרסיס	3A	BIFENTHRIN	אטלס ת"מ טלסטאר ת"מ סטרטר ת"מ
0.3	0.7	0.6	0.6 (1.2-paste)			3	100 סמ"ק	כ.צ.ט	22B	METAFLUMIZONE	אלוורדה ת"ר
0.05	0.6	0.6	1.4	א. אירופי, אנגליה		3	20 סמ"ק	אדמה מכתשים	28 3A	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	אמפליגו שת"ר
0.1	0.07	0.07	0.1 (6-dry or wet pomace)			3	20 סמ"ק	אדמה מכתשים	28 3A	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	אמפליגו שת"ר
0.2	1.5	1	1			3	20 - 30 סמ"ק	אדמה אגן	לא ידוע	PYRIDALYL	בז ת"מ
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	250 סמ"ק	ביו דליה	11A	<i>Bacillus thuringiensis</i>	ביו טי פלוס ת"ר
							75 גרם	גדות אגרו			דלפין ג"ר
							50 - 100 גרם	אדמה מכתשים			פרוביט ג"ר
0.02	0.2 (0.01 מ-7.3.26)	0.7	0.25 (0.8-paste)	א. אירופי, החל מ- 7.3.26	עד 2 ריסוסים בעונה	3	30 סמ"ק	אדמה אגן	4A 28	THIAMETHOXAM + CHLORANTRANILIPROLE	דוריבו ת"ר
0.05	0.6	0.6	1.4			3	10 גרם	אדמה מכתשים	15 6	LUFENURON + EMAMECTIN BENZOATE	דנים פיט ג"ר
0.01	0.02	0.4	0.02 (0.15-paste)	ארה"ב		3	10 גרם	אדמה מכתשים	15 6	LUFENURON + EMAMECTIN BENZOATE	דנים פיט ג"ר
0.2	0.1	0.07	0.2 (1-paste, puree)	א. אירופי, אנגליה		14	0.0125-0.025%	גדות אגרו	3A	DELTAMETHRIN	דסיס אקספרט ת"מ
0.3	2	0.2	0.6	אנגליה		5	15 גרם	אדמה מכתשים	28	FLUBENDIAMIDE	טאקומי ג"ר
0.01	0.06	0.5	0.4			3	40 סמ"ק	אגריכס	5	SPINETORAM	ספרטה סופר ת"ר
0.01	0.02	0.02	0.02 (0.15-paste)			7	40 סמ"ק	אגרולב אדמה אגן תפוזל	6	EMAMECTIN BENZOATE	פוקר ת"מ פרוקליים ת"מ פרפקט ת"מ
0.05	*0.01	0.5		א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		14	200 סמ"ק	לידור	4A 3A	THIACLOPRID + DELTAMETHRIN	פרותיאוס תש"מ
0.2	0.1	0.07	0.2 (1-paste, puree)			14	30 סמ"ק	תפוזל	15	TEFLUBENZURON	שונית ת"ר
0.5	1.5	1.5	1.5			14	30 סמ"ק	תפוזל	15	TEFLUBENZURON	שונית ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב	<i>Spodoptera littoralis</i> פרודניה							
1.4	0.6	0.6	0.05			3	20 סמ"ק	תפוזל גדות אגרו	28	CHLORANTRANILIPROLE	אודין ת"ר קורגן ת"ר
1.5 0.02 (0.15-paste)	1.5 0.02	1.5 0.02	0.5 0.01			14	50 סמ"ק	תפוזל	15 6	TEFLUBENZURON + EMAMECTIN BENZOATE	אקזיט ת"ר
1	1	1.5	0.2		עד שני רסוסים בעונה.	3	20 סמ"ק	אדמה אגן	לא ידוע	PYRIDALYL	בז ת"מ
0.2 (1-paste, puree)	0.07	0.1	0.2	א. אירופי, אנגליה		14	0.0125-0.025%	גדות אגרו	3A	DELTAMETHRIN	דסיס אקספרט ת"מ
	0.5	0.5	0.5	ארה"ב		14	30 - 50 סמ"ק	לוכסמבורג	3A	CYPERMETHRIN	טיטאן 20 ת"מ
							רימי				סיפרין 20 ת"מ
							אדמה מכתשים				תרסיס ת"מ
							60 - 100 סמ"ק	רימי			סיפרין 10 ת"מ
0.4	0.7	0.7	0.05			3	100 סמ"ק	תפוזל	5	SPINOSAD	טרויה ת"ר
1	0.01*	0.01*	1	א. אירופי, אנגליה		3	200 - 350 סמ"ק	גדות אגרו	1A	METHOMYL	לאנט 20 ת"נ
							50 - 75 גרם	גדות אגרו			לאנט 90 א"מ
							80 - 100 גרם	אדמה מכתשים			מתומקס 90 א"מ
								תרסיס			מתוניט 90 א"מ
0.5	0.1	0.1	1	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		10	100 - 150 סמ"ק	אדמה אגן	3A	ESFENVALERATE	מוסטנג ת"מ
2 0.02 (0.15-paste)	2 0.02	0.6 0.02	0.5 0.01			7	75 סמ"ק	תפוזל	18 6	METHOXYFENOSIDE + EMAMECTIN BENZOATE	מטרופולין ת"ר
	0.4	0.4	0.2	ארה"ב		14	40 סמ"ק	כ.צ.ט. אדמה אגן אגרולב תפוזל	15	LUFENURON	מירון 50 ת"מ מץ' ת"מ מצדה ת"מ צבר ת"מ
	0.01D	0.01D	פטור			0	1.5 - 2 ק"ג	רימי	לא מסווג	SODIUM FLUOSILICATE	ספסן 515 פ"ג
							2 - 1.5 ק"ג				ספסן 1015 פ"ג
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	100 - 200 גרם	אדמה מכתשים	11A	<i>Bacillus thuringiensis</i>	פרוביט ג"ר
2	2	0.6	0.5			3	50 - 75 סמ"ק	אגריכס	18	METHOXYFENOSIDE	ראנר ת"ר
2	1	*0.01	0.2	א. אירופי		4	50 סמ"ק	אדמה מכתשים	15	NOVALURON	רימון 10 ת"מ
1.5	1.5	1.5	0.5			14	50 סמ"ק	תפוזל	15	TEFLUBENZURON	שונית ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב								
				תריפס Thrips							
	0.3	0.3	0.5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	עד 3 יישומים בעונה, לא ברציפות. תוספת סוכר עשויה לשפר את הקטילה.	4	100 גרם	רימי	1A	FORMETANATE HCL	דיקרזול א"מ
0.2 (1-paste, puree)	0.07	0.1	0.2	א. אירופי, אנגליה		14	0.0125-0.025%	גדות אגרו	3A	DELTAMETHRIN	דסיס אקספרט ת"מ
	0.5	0.5	0.5	ארה"ב		14	0.15%	תרסיס	3A	CYPERMETHRIN	תרסיפ ת"מ
				בוטריטיס (עובש אפור) Botrytis cinerea							
0.5	1	1	1	ארה"ב		3	250 סמ"ק	תפוזל	D1	PYRIMETHANIL	אתוס 300 ת"ר
								לידור			מיתוס ת"ר
							0.2%	כ.צ.ט			פורטיס ת"ר
							125 סמ"ק	אדמה מכתשים			פרדיקט ת"ר
3	3	3	0.3		למניעת עמידות - 3 ריסוסים לעונה לא ברציפות	3	75 גרם	כ.צ.ט	C2	BOSCALID +	בליס ג"ר
1.4	0.3	0.3	0.05			6		אדמה אגן	C3	PYRACLOSTROBIN	סיגנום ג"ר
1.5	1.5	1.5	0.5			3	150 סמ"ק	אדמה מכתשים	D1	CYPRODINIL +	בנלוס ת"מ
1.3	0.9	0.9	0.5						G1		
3	3	3	0.3			6	100 סמ"ק	תפוזל	C2	BOSCALID +	דיסקברי ת"ר
0.5	0.7	0.7	0.2						C3		
5	3	3	0.3	ארה"ב		3	200 סמ"ק	תפוזל	E2	FLUDIOXONIL +	טוויסט ת"ר
0.5	1	1	1						D1		
	1	1	0.1	ארה"ב.		3	100 סמ"ק	אדמה מכתשים	A3	THIOPHANATE METHYL	טופז א"ר
	פטור	פטור	פטור			3	200 סמ"ק	סטוקטון	לא ידוע	TEA TREE OIL	טימורקס גולד ת"מ
0.5	1	1	1	ארה"ב		3	120 סמ"ק	לידור	D1	PYRIMETHANIL +	לונה טרניקיליטי 500 ת"ר
1	0.9	0.5	0.35						C2		
1.5	1.5	1.5	0.5		עד 3 יישומים בעונה	4	60 סמ"ק	תרסיס	D1	CYPRODINIL +	סוואנה ת"ר
5	3	3	0.3				60 גרם	אדמה אגן	E2		FLUDIOXONIL
פטור	פטור	פטור	פטור			3	1%	אגרימור	רב אתרי	Bacillus subtilis	סרן א"ר
	3	3	1.8	ארה"ב	עד שני יישומים בעונה	3	100 גרם	אדמה אגן	G3	FENPYRAZAMINE	פרולקטוס ג"ר
0.5	1.5	1.5	0.1			14	125 סמ"ק	גדות אגרו	D1	MEPANIPYRIM	פרופיקה ת"ר
	1.5	1.5	1	ארה"ב	עד 2 יישומים במרווח של 7 ימים	3	100 סמ"ק	לוכסמבורג	C2	ISOFETAMID	קנג'ה ת"ר
3 (3.5-paste)	2	2	0.15		2 יישומים במרווח של 7 ימים	6	100 סמ"ק	רימי	C2	PENTHIOPYRAD	שידו ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
				חלפת / סטמפיליום Alternaria spp. / Stemphylium botryosum							
2.5 (Mancozeb)	2	*0.05	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		7	250 - 300 גרם	לידור	רב אתרי	PROPINEB	אנטרקול א"ר
5	0.01*	0.01*	5	א. אירופי, אנגליה	טיפול מניעה במרווח של 7-10 ימים. ניתן לשלב עם cymoxanil להדברת מחלה קיימת	3	200 סמ"ק	אדמה אגן	רב אתרי	CHLOROTHALONIL	בראבו 720 ת"ר
								תרסיס			ברבי 720 ת"ר
								תפזול			ברק ת"ר
						3	300 סמ"ק	גדות אגרו			נוגל ת"ר
0.6	2	2	0.3			7	50 סמ"ק	כ.צ.ט	G1	DIFENOCONAZOLE	בוגירון ת"מ
								תרסיס			סקוטר ת"מ
								אדמה אגן			סקור ת"מ
								תפזול			סקיפר ת"מ
2.5	3	3 (צפוי לרדת ל-2)	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		5	350 גרם	גדות אגרו	רב אתרי לא ידוע	MANCOZEB + CYMOXANIL	דרגופיקס א"ר
0.2	0.4	0.4	גדות אגרו					מנקור א"ר			
			תרסיס					צימוקלין א"ר			
1.3	0.9	0.9	0.5			21	75 סמ"ק	גדות אגרו	G1	TEBUCONAZOLE	טבוקול ת"מ
								לידור			פוליקור ת"מ
								כ.צ.ט			פולירון ת"מ
	פטור	פטור	פטור			3	200 - 300 סמק	סטוקטון	לא ידוע	TEA TREE OIL	טימורקס גולד ת"מ
2.5 (Mancozeb)	3	3 (צפוי לרדת ל-2)	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		5	250 גרם	אדמה אגן	רב אתרי	METIRAM	פולירס DF ג"ר
2.5	3	3 (צפוי לרדת ל-2)	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	עד 4 יישומים בעונה	5	250 גרם	גדות אגרו	רב אתרי	MANCOZEB	טרידקס גרגרי
								לוכסמבורג			מנקו די ג"ר
								לוכסמבורג			מנקוזן א"ר
								גדות אגרו			מנקוטל א"ר
								אגריכס			סנקוזב א"ר
								אגריכס			סנקוזב ג"ר
	1.5	1.5	1	ארה"ב	עד 2 יישומים במרווח של 7 ימים	3	50 סמ"ק	לוכסמבורג	C2	ISOFETAMID	קנג'יה ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב	<i>Phytophthora infestans</i> כימשון							
5	0.01*	0.01*	5	א. אירופי, אנגליה	טיפולי מניעה במרווח של 7-10 ימים. בשילוב עם ויטן ניתן לשלב עם סיימוקס ו/או דיימונד להדברת מחלה קיימת.	3	180 גרם	אדמה מכתשים	רב אתרי	CHLOROTHALONIL	אודאון ג"ר
							200 סמ"ק	אדמה אגן			בראבו 720 ת"ר
								תרסיס			ברבי 720 ת"ר
								תפוזל			ברק ת"ר
1.5	2	2	0.02			4	100 סמ"ק	אדמה אגן	C8 H5	AMETOCTRADIN + DIMETHOMORPH	אורבגו ת"ר
1.5	1	1	0.5								
2.5 (Mancozeb)	2	*0.05	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		7	250 - 300 סמ"ק	לידור	רב אתרי	PROPINEB	אנטרקול א"ר
1.5	1	1	0.5		בשילוב דרגופיקס	7	50 גרם	גדות אגרו	H5	DIMETHOMORPH	אצן ג"ר
					בשילוב עם צימוקלין			תרסיס			אתלט ג"ר
					בשילוב ויטן או קורזייט ומנצידן		40 - 50 סמ"ק	תפוזל			דיימונד ת"ר
					בשילוב צימוקלין/מנקור		50 סמ"ק	אדמה מכתשים			ספינקס ת"ר
2.5	3	3 (צפוי לרדת ל-2)	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	בשילוב עם רידומיל גולד MZ, ניתן לשילוב גם עם ויטן	3	225 גרם	כ.צ.ט.	רב אתרי H5	MANCOZEB + DIMETHOMORPH	אקרובט 69 ג"ר
1.5	1	1	0.5								
1.5	1	1	0.5			3	100 גרם	אדמה מכתשים	H5 C5	DIMETHOMORPH + FLUAZINAM	באנג'ו פורטה ת"ר
1.5	0.3	0.3	0.01								
פטור	5	5	פטור			7	100 - 200 גרם	תפוזל	רב אתרי	COPPER HYDROXIDE	בלוז ת"ר
								גדות אגרו			קוצייד 2000 ג"ר
							200 גרם	אגרולב			קופרסייד ג"ר
								ביו-יום			קופרפוס ת"ר
5	0.01*	0.01*	5	א. אירופי, אנגליה	המינון הנמוך, בשילוב עם סיימוX	7	250 - 350 סמ"ק	תפוזל	רב אתרי	CHLOROTHALONIL + DIMETHOMORPH	ברקוד ת"ר
1.5	1	1	0.5				350 גרם	אדמה מכתשים	H5		ספינקס סופרה ג"ר
2.5	3	3 (צפוי לרדת ל-2)	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		5	300 גרם	אדמה מכתשים	רב אתרי A1	MANCOZEB + METALAXYL	דו רה מי א"ר
1 (3-paste, puree)	0.3	0.3	0.5			7		גדות אגרו			מנקולקסיל א"ר
4 (5-paste)	4	4	0.2		יש לשלב עם תכשיר נוסף במפורט בתוית	3	150 סמ"ק	אדמה מכתשים	F4	PROPAMOCARB HCl	דותן-פרופלנט ת"נ
2.5	3	3 (צפוי לרדת ל-2)	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		5	350 גרם	גדות אגרו	רב אתרי לא ידוע	MANCOZEB + CYMOXANIL	דרגופיקס א"ר
					המירווח בין הרסוסים 7 ימים.			גדות אגרו			מנקור א"ר
					בשילוב עם אתלט			תרסיס			צימוקלין א"ר
0.2	0.4	0.4	0.2			4	600 גרם	אדמה מכתשים			סימוקס-טופ א"ר
0.45	0.3	0.3 (0.01 מ-5.26)	0.05	א. אירופי, החל מ- 5.26 (מועד משוער)		7	40 סמ"ק	אגריכס	H5 F9	BENTHIAVALICARB + OXATHIAPROLIN	זורבק אנדביה תש"מ
0.5 (3-dried)	0.4	0.4	0.1								

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב								
				המשך: כימסון <i>Phytophthora infestans</i>							
1	2	2	1			7	50 סמ"ק	גדות אגרו	C3 F9	FAMOXADONE + OXATHIPIPROLIN	זורבק אנקנטיה ר"ת
0.5 (3-dried)	0.4	0.4	0.1								
5	0.01*	0.01*	5	א. אירופי, אנגליה		3	300 סמ"ק	גדות אגרו	רב אתרי לא ידוע	CHLOROTHALONIL + CYMOXANIL	זטניל C ת"ר
0.2	0.4	0.4	0.2								
0.2	0.4	0.4	0.2		המינון וימי ההמתנה, בהתאם לתכשיר המשולב, ראה בתוית	3	70-125 גרם	לוכסמבורג	לא ידוע	CYMOXANIL	ויטן ג"ר
						5	100 גרם	תרסיס			סיימון ג"ר
							70 - 110 גרם	תפזול			סיימוקס X ג"ר
						3	60 - 80 גרם	גדות אגרו			סימוקסן 60 ג"ר
								גדות אגרו			קורזייט 60 ג"ר
						3	60 גרם	כ.צ.ט			סיני ג"ר
						3	200 - 300 סמ"ק	סטוקטון	לא ידוע	TEA TREE OIL	טימורקס גולד ת"מ
2.5	3	3 (צפוי לרדת ל-2)	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	עד 4 יישומים בעונה	5	250 גרם	גדות אגרו	רב אתרי	MANCOZEB	טרידקס גרגרי
								לוכסמבורג			מנקו די ג"ר
								לוכסמבורג			מנקוזן א"ר
								גדות אגרו			מנקוטל א"ר
						7		אגריכס			סנקוזב ג"ר
								אדמה מכתשים			מנצידן 80 אינדופיל
								אדמה מכתשים			מנצידן 75 אינדופיל
								אגריכס			סנקוזב א"ר
פטור	5	5	פטור		יש לדאוג לכיסוי מלא של הצמחים	7	300 סמ"ק	רב אתרי	TRIBASIC COPPER SULFATE	טריו ת"ר	
							400 גרם/דונם			אדמה אגן	נחושתן ת"ר
								רימי			מרק בורדו אולטרא
פטור	5	5	פטור			7	300 סמ"ק	אדמה מכתשים	רב אתרי	COPPER SULFATE PENTAHYDRATE	מאסטרקופ ת"ר
1 (3-paste, puree)	0.3	0.3	0.5	א. אירופי, אנגליה		5	400 סמ"ק	תפזול	A1 משרה עמידות	METALAXYL-M + POTASSIUM PHOSPHITE	מונסון ת"נ
פטור	100	70	פטור								
5	0.01*	0.01*	5	א. אירופי, אנגליה	עד 4 יישומים בעונה	14	250 סמ"ק	תפזול	רב אתרי	CHLOROTHALONIL + METALAXYL-M	מטאל גולד ת"ר
1 (3-paste, puree)	0.3	0.3	0.5					אדמה אגן			A1
5	0.01*	0.01*	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	150 סמ"ק	אדמה אגן	רב אתרי C3	CHLOROTHALONIL + AZOXYSTROBIN	קומודור ת"ר
0.2 (0.6-paste)	3	3	0.5								

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
											המשך: כימסון <i>Phytophthora infestans</i>
פטור	100	70	פטור	א. אירופי, אנגליה	יישום יחיד בשנה	3	400 סמ"ק	לוכסמבורג	משרה עמידות רב אתרי	POTASSIUM PHOSPHITE + CHLOROTHALONIL	קוסמוס ת"ר
5	0.01*	0.01*	5								
0.2	0.4	0.4	0.2			3	60 סמ"ק	אדמה מכתשים	לא ידוע H5	CYMOXANIL + MANDIPROPAMID	קריאל פלוס ג"ר
1	3	3	0.3								
1	3	3	0.3		בשילוב רידומיל גולד MZ או קורזייט או ויטן	3	60 סמק	אדמה אגן	H5	MANDIPROPAMID	רבוס 250 ת"ר
2.5	3	3 (צפוי לרדת ל-2)	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	אין לרסס יותר מ-2-3 פעמים בעונה.	5	300 גרם	תרסיס	רב אתרי	MANCOZEB + METALAXYL-M	רודאו MZ ג"ר
1 (3-paste, puree)	0.3	0.3	0.5			14		אדמה אגן	A1		רידומיל גולד MZ
0.9	0.6	0.6	0.6		עד 2 יישומים בעונה	7	50 סמ"ק	לוכסמבורג	C4	CYAZOFAMID	רנמן טופ ת"ר
											ניקוד בקטרי <i>Pseudomonas syringae</i>
פטור	5	5	פטור			7	0.3 - 0.5%	גדות אגרו	רב אתרי	COPPER HYDROXIDE	בלו שילד א"ר
								גדות אגרו			פרסול ג"ר
							0.3%	רימי			פונגורן א"ר
							0.25 - 0.4%	גדות אגרו			קוצייד 2000 ג"ר
פטור	100	70	פטור			7	0.4%	לוכסמבורג	משרה עמידות רב אתרי	POTASSIUM PHOSPHITE + COPPER OXYCHLORIDE	הרקולס ת"ר
פטור	5	5	פטור								
פטור	5	5	פטור			7	200 גרם	אדמה אגן	רב אתרי רב אתרי	COPPER OXYCHLORIDE + COPPER HYDROXIDE	סופרקופ ג"ר
פטור	5	5	פטור								
פטור	5	5	פטור	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	300 גרם	לידור	רב אתרי	COPPER OXYCHLORIDE + PROPINEB	קופרו אנטרקול א"ר
2.5 (mancozeb)	2	0.05	5								
											עובש עלים <i>Fulvia fulva</i>
1.3	0.9	0.9	0.5			21	75 סמ"ק	אדמה מכתשים	G1	TEBUCONAZOLE	אוריוס 25 ת"ש
								גדות אגרו			טבוקול ת"מ
								כ.צ.ט.			פולירון ת"מ
0.6	2	2	0.3			7	100 סמ"ק	כ.צ.ט.	G1	DIFENOCONAZOLE	בוגירון ת"מ
								אגרולב			דיפקור ת"מ
								אדמה אגן			סקוטר ת"מ
								תרסיס			סקור ת"מ
								תפוזל			סקיפר ת"מ
3	3	3	0.3		למניעת עמידות - 3 ריסוסים לעונה לא ברציפות	3	75 גרם	כ.צ.ט.	C2	BOSCALID +	בליס ג"ר
1.4	0.3	0.3	0.05			6		אדמה אגן	C3	PYRACLOSTROBIN	סיגנום ג"ר
0.3	0.1	0.15	0.05			3	0.1%	לוכסמבורג	G1	TETRACONAZOLE	דומארק ת"מ

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב								
				המשך: <u>עובש עלים</u> <i>Fulvia fulva</i>							
3 0.5	3 0.7	3 0.7	0.3 0.2			6	100 סמ"ק	תפוזל	C2 C3	BOSCALID + TRIFLOXYSTROBIN	דיסקברי ת"ר
0.2 (0.6-paste)	3	3	0.5	ארה"ב	אין לרסס עד 21 ימים משתילה.	10	50 סמ"ק	תפוזל	C3	AZOXYSTROBIN	זאוס ת"ר
								אדמה מכתשים			מירדור ת"ר
								אדמה מכתשים			עמיסטר ת"ר
0.5	0.7	0.7	0.2		רצוי לבצע ריסוסי מניעה כשאין נגיעות.	3	20 גרם	לידור	C3	TRIFLOXYSTROBIN	פלינט ג"ר
3 0.2	3 3	3 3	0.3 0.5	ארה"ב		10	200 סמ"ק	תפוזל	C2 C3	BOSCALID + AZOXYSTROBIN	פרימיום ת"ר
				<u>קימחונית / קימחון</u> <i>Oidiopsis sicula / Oidium neolycopersici</i>							
1.7	0.02*	0.02*	0.03	א. אירופי, אנגליה		7	30 - 40 סמ"ק	אגריכס	E1	QUINOXYFEN	אביר ת"ר
			פטור			7	1%	אגרימור	לא מסווג	CALCIUM POLYSULPHIDE	אגרימור-נס ת"נ
	0.1	0.1	0.2	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	50 סמ"ק	אדמה מכתשים	G1	PENCONAZOLE	אופיר 2000 ת"ש
							75-100 סמ"ק	כ.צ.ט			אורון ת"מ
							100 סמ"ק	אגרולב			טופנקו 100 ת"מ
								תפוזל			עומר ת"מ
1.3	0.9	0.9	0.5		עד 2 יישומים בעונה ולא ברציפות	21	75 סמ"ק	אדמה מכתשים	G1	TEBUCONAZOLE	אוריוס 25 ת"ש
								גדות אגרו			טבוקול ת"מ
								לידור			פוליקור ת"מ
								כ.צ.ט			פולירון ת"מ
0.2 (0.6-paste) 0.3	3 0.1	3 0.15	0.5 0.05	ארה"ב	ריסוס אחד בעונה	10	0.06%	אדמה אגן	C3 G1	AZOXYSTROBIN + TETRACONAZOLE	אמרלד אנרגי ת"ר
	0.05*	0.05 (צפוי לזדט ל-0.01)	0.05	ארה"ב.	יישום יחיד בעונה	3	40 סמ"ק	אדמה אגן	G1	CYPROCONAZOLE	אטמי אקסטרה ת"נ
								תרסיס			סיפרו ת"נ
								תפוזל			צפריר ת"נ
	0.3	*0.01	0.5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	75 סמ"ק	לידור	G1	TRIADIMENOL	באיפידן ת"מ
								אדמה מכתשים			שביט ת"מ
0.6	2	2	0.3			7	100 סמ"ק	כ.צ.ט	G1	DIFENOCONAZOLE	בוגירון ת"מ
								אגרולב			דיפקור ת"מ
								תרסיס			סקוטר ת"מ
								אדמה אגן			סקור ת"מ
								תפוזל			סקיפר ת"מ

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב								
				המשך: קימחונית / קימחון <i>Oidiopsis sicula / Oidium neolycopersici</i>							
3	3	3	0.3		למניעת עמידות - 3 ריסוסים לעונה לא ברציפות	3	75 גרם	כ.צ.ט.	C2	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	בליס ג"ר
1.4	0.3	0.3	0.05			6		אדמה אגן	C3		סיגנום ג"ר
פטור	פטור	פטור	פטור			3	0.4% - 0.8%	לוכסמבורג	רב אתרי	SULFUR	גופרית ת"ר
							0.4%	תרסיס			סולפרון גרגרי
							3 - 4 ק"ג	אדמה מכתשים			גפרביק 70 אב'
							0.75%	איתן בר-הדס			גפרכל א"ר
							1%	אדמה מכתשים			הליוגופרית ת"ר
								רימי			מיקרוטיול ג"ר
								אגרולב			סולי ג"ר
							גדות אגרו	סופה ת"ר			
							0.5%	ביו יום			סוליסט ג"ר
							200 גרם	תפזול			סולפוזול ג"ר
							400 גרם	כ.צ.ט.			קומולוס ג"ר
							0.5-1%	אדמה מכתשים			תיוביט ג"ר
		פטור	פטור		בתוספת משטח אגוז 0.4%	3	1%	דע-קדם	לא ידוע לא ידוע	CANOLA OIL + NEEM OIL	גניקן ת"מ
פטור	0.01D	0.01D	פטור					3	60 - 75 סמ"ק	לוכסמבורג	G1
0.3	0.1	0.15	0.05			3	400 סמ"ק	לוכסמבורג	רב אתרי G1	SULFUR + TETRACONAZOLE	דומארק קומבי א"ר
פטור	פטור	פטור	פטור			6	100 סמ"ק	תפזול	C2 C3	BOSCALID + TRIFLOXYSTROBIN	דיסקברי ת"ר
0.3	0.1	0.15	0.05								
3	3	3	0.3			6	100 סמ"ק	תפזול	C2 C3	BOSCALID + TRIFLOXYSTROBIN	דיסקברי ת"ר
0.5	0.7	0.7	0.2								
	פטור	פטור	פטור			3	150 סמ"ק	סטוקטון	לא ידוע	TEA TREE OIL	טימורקס אקט ת"מ
							150-300 סמ"ק	סטוקטון			טימורקס גולד ת"מ
	0.15	0.15	0.1	ארה"ב	עד 2 יישומים בעונה בהפרש של לפחות 14 יום	7	40 סמ"ק	גדות אגרו	E1	PROQUINAZID	טליוס ת"מ
0.9	0.6	0.6	0.2			6	30 סמ"ק	כ.צ.ט.	B6	METRAFENONE	ויוואנדו 500 ת"ר
פטור	פטור	פטור	פטור		מתאים לסטנדרט אמריקאי NOP	3	1%	דע-קדם	לא מסווג	HYDROGEN PEROXIDE	כיפת ברזל ת"נ
1.3	0.9	0.9	0.5			3	50 סמ"ק	לידור	G1 C2	TEBUCONAZOLE + FLUOPYRAM	לונה אקספריאנס 400 ת"ר
1	0.9	0.5	0.35								
0.5	0.7	0.7	0.2			3	40 סמ"ק	לידור	C3 C2	TRIFLOXYSTROBIN + FLUOPYRAM	לונה סנסיישן 500 ת"ר
1	0.9	0.5	0.35								
פטור	פטור	פטור	פטור		1 ק"ג ל-100 ליטר מים.	7	1%	דע-קדם	לא מסווג רב אתרי	POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE + COPPER SULPHATE	מור א"מ
פטור	5	5	פטור								

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב								
				המשך: קימחונית / קימחון <i>Oidiopsis sicula / Oidium neolycopersici</i>							
0.2 (0.6-paste)	3	3	0.5	ארה"ב	יישום בריסוס. אין לרסס עד 21 יום משתילה.	10	50 סמ"ק	תפזול	C3	AZOXYSTROBIN	זאוס ת"ר
						15		אגרולב			טופסטאר ת"ר
						10		אדמה מכתשים			מירדור ת"ר
								אדמה מכתשים			עמיסטר ת"ר
								תרסיס			עמיעוז ת"ר
								זאוס ת"ר			
					בהגמעה. 2 יישומים בעונה בהפרש של חודש. טיפול ראשון חודש משתילה.	7	150 סמ"ק	תפזול			מירדור ת"ר
								אדמה מכתשים			עמיסטר ת"ר
								אדמה מכתשים			עמירן ת"ר
								גדות אגרו			
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	1%	אדמה מכתשים	לא ידוע	NEEM OIL	נימגארד שמן
0.2	0.04	0.04	0.05	א. אירופי, אנגליה	למניעת תנגודת יש לשלב שביט.	3	20 סמ"ק	אדמה אגן	לא ידוע	CYFLUFENAMID	נץ ת"ש
0.2	0.04	0.04	0.05	א. אירופי, אנגליה		5	100 סמ"ק	אדמה מכתשים	לא ידוע G1	CYFLUFENAMID + DIFENOCONAZOLE	סידלי טופ ת"פ
0.6	2	2	0.3								
0.3 (0.5-puree, 1-paste)	0.3	0.6	0.3			7	50 סמ"ק	אדמה מכתשים	G1	MYCLOBUTANIL	סיסטאן 24 ת"מ
							60 סמ"ק	אגריכס			ראלי ת"ש
פטור	פטור	פטור	פטור			3	500 סמ"ק	לוכסמבורג	רב אתרי	Bacillus subtilis	סרנייד ASO ת"ר
	0.01D	0.01D	פטור	בהיעדר נתוני דעיכה לא ניתן לקבוע התאמה ליעדי יצוא		3	15 - 25 גרם	גדות אגרו	H4	POLYOXINS	פולאר ג"מ
0.2 (0.6-paste)	3	3	0.5	ארה"ב		10	40 סמ"ק	אדמה מכתשים	C3 G1	AZOXYSTROBIN + CYPROCONAZOLE	פריורי אקסטרה ת"ר
3	3	3	0.3	ארה"ב		10	200 סמ"ק	תפזול	C2 C3	BOSCALID + AZOXYSTROBIN	פרימיום ת"ר
0.2	3	3	0.5								
0.5	0.7	0.7	0.2		רצוי לבצע ריסוסי מניעה כשאין נגיעות.	3	0.02%	תפזול	C3	TRIFLOXYSTROBIN	פאנטום ת"ר
								לידור			פלינט ג"ר
0.2	0.01*	0.01*	0.8	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	עד 2 יישומים בעונה	3	30 סמ"ק	לוכסמבורג	B6	PYRIFENONE	קאסורי ת"ר
5	0.01*	0.01*	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	150 סמ"ק	תרסיס	רב אתרי C3	CHLOROTHALONIL + AZOXYSTROBIN	קולונל ת"ר
0.2 (0.6-paste)	3	3	0.5					אדמה אגן			קומודור ת"ר
פטור	פטור	פטור	פטור			3	0.1%	גדות אגרו	לא מסווג	POTASSIUM BICARBONATE	קליגרין א"מ
	פטור	פטור	פטור			4	50 סמ"ק	סטוקטון	לא ידוע G1	TEA TREE OIL + DIFENOCONAZOLE	רגב ת"מ
0.6	2	2	0.3								

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב								
				חיטוי קרקע Soil sterilization							
	0.01*	0.01*	0.01		יישום 14-30 יום לפני שתילה. להדברת נמטודות יוצרות עפצים. יישום ע"י מי שעבר השתלמות ייעודית.	ראה הערה	20 - 15 ליטר	גדות אגרו		1,3 DICHLOROPROPENE	אגרוכלון ת"מ
								אגריכס			טלון II נ'
								אגריכס			קונדור ת"מ
								אגרולב			קונרי ת"מ
	0.1	0.4	0.05		יישום 14-30 יום לפני שתילה, להדברת דוררת, פיתיוס (מקמקת) וקשיון רולפסי. הוראות שימוש מפורטות ראה בתווית	ראה הערה	43 ליטר	סוילטק		METAM SODIUM	אדוכס סופר ת"נ
							36 / 47 ליטר	אדמה אגן			אדיגן סופר ת"נ
							36 ליטר	אגרולב			אדירם 510 ת"נ
							40 ליטר	גדות אגרו			מתמור 510 ת"נ
	0.01D	0.01D	פטור		יישום 10-14 יום לפני שתילה. להדברת נמק הליבה, קיב חיידקי וריקבון רך חיידקי. יישום ע"י קבלן מורשה	ראה הערה	400 - 500 ליטר	דור כימיקלים		FORMALDEHYDE	פור-דור 37 ת"נ
	0.01D	0.01D	0.01		יישום 14-30 יום לפני שתילה, להדברת נמטודות עפצים ומניעת עשבייה	ראה הערה	60 - 40 ליטר	רימי		DIMETHYL DISULFIDE	פלדין ת"מ
				ויסות צמיחה Growth regulation							
					ריסוס תפרחות בלבד, להגברת חנטה ולהגדלת פרי		0.2%	דשנים וחומרים כימיים		BETA NAPHTOXY ACETIC ACID	חנטאון ת"נ
					ראה הוראות טיפול בתווית.		0.1 - 0.2%	קשת פרימה		NMT	אורסט א"ר
				מכות שמש Sun burns							
			פטור			21	4 ק"ג	תפזול		ZINC	ילבין א"ר
		פטור	פטור		רסס לפני שלב הבשלת הפרי	3	5%	לוכסמבורג		KAOLIN	סראונד א"ר
			פטור				10 - 15%	קוי		ZINC OXIDE	קול פלנט א"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	שם התכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל	נמוכה מזו של ישראל							
				משטחים / חומרי עזר <u>Adjuvants</u>							
			פטור		לשילוב עם ביו-טי פלוס	בהתאם לתכשיר המשולב	0.2%	ביו-יום		TERPENE ALCOHOLS	אטו ת"מ
פטור	פטור	פטור	פטור			3	1%	גדות אגרו	לא ידוע	PARAFFINIC OIL	דימול שמן
פטור	פטור	פטור	פטור			3	1%	תרסיס	לא ידוע	SUMMER OIL	וירותר ת"ש
					לשילוב עם טיטוס	בהתאם לתכשיר המשולב	0.05%	גדות אגרו		ALKYL POLYETHOXY ETHANOL FATTY ACIDS ISOPROPANOL	טיבולין ת"נ
			פטור		לשילוב עם ביו-טי פלוס או ביוגארד	בהתאם לתכשיר המשולב	0.07%	ביו-יום		ETHOXYLATED POLYDIMETHYLSILOXAN	מחץ ת"נ
			פטור		לשילוב עם תכי אבמקטין	בהתאם לתכשיר המשולב	0.2% - 0.1%	כ.צ.ט		ALKYL PHENOXY POLYETHYLENE ETHANOL	משטח BB5 ת"נ
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	1%	גדות אגרו	לא ידוע	NEEM OIL	נימטול שמן

קוטלי עשבים מורשים לשימוש בעגבניות לתעשייה: עונת 2026

שם התכשיר	חומר פעיל	קבוצת פעילות	בעל הרשיון	שלב/גיל גידול	שלב/גיל עשב	מינון/ד' מרוסס או %	הערות	השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	שאריות מרביות מותרות (MRL)					
									ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב		
אגיל 100 ת"מ	PROPAQUIZAFOP	1	אדמה מכתשים		א"ה	50 - 150 סמ"ק	דגניים רב שנתיים יטופלו לפני פריחה ע"ג עשביה רעננה	ארה"ב	0.01	0.05	0.05			
אסטון 200 ת"נ	GLUFOSINATE AMMONIUM	10	אגרולב	ק"ש	עד 10 ס"מ	250-600 סמ"ק	הכנת שטחים		0.01	0.1	0.1	0.1 (0.15-paste)		
בומבה ת"נ			גדות אגרו			250-1,000 סמ"ק								
בסט-ביי ת"נ			תרסיס											
בסטה 15 ת"נ			גדות אגרו											
ברנר ת"נ			אדמה אגן											
פאסטר ת"נ			תפזול											
אוקסיגל ת"מ	OXYFLUORFEN	14	תפזול	ק"ש	ק"ה ועד 10 ס"מ	150 - 200 סמ"ק	הכנת שטחים, בשילוב תכ' גלייפוסט. אין לטפל בשדה שיישתל לפני 1 באפריל.	א. אירופי, ארה"ב	0.02	0.01	0.05*			
גול ת"מ			אגריכס			30 - 50 סמ"ק								
גליגן ת"מ			אדמה אגן			200 סמ"ק								
גליל ת"מ			כ.צ.ט											
אוקסיפסט ת"ר	GLYPHOSATE + OXYFLUORFEN	9	אדמה מכתשים	עד שבועיים ק"ש	א"ה, עד 40 ס"מ	200 סמ"ק	הכנת שטחים. אין לרסס בקרקעות חוליות המכילות פחות מ-10% חרסית	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	0.2	0.1*	0.1*	0.1		
זומר ת"ר		14	אדמה אגן						0.02	0.01	0.05*			
איזיקטול ת"נ	GLYPHOSATE	9	לוכסמבורג	הכנת שטחים	עשבייה קיימת	100-150 סמ"ק	עד שבועיים לפני שתילה. בתוספת משטח.		0.1	0.1*	0.1*	0.1		
גלייפוגן ת"נ			אדמה אגן											
גלייפוס ת"נ			לוכסמבורג											
אונדאפ ת"נ			אדמה אגן			50-75 סמ"ק								
אונדאפ מקס			אדמה אגן										100 סמ"ק	
טייפון ת"נ			תפזול											100-600 סמ"ק
גלייפון ת"נ			גדות אגרו											
גלנט סופר ת"מ	HALOXYFOP R METHYL	1	אגריכס			35 - 100 סמ"ק		א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	0.02	0.01*	0.01*			
דגנול F ת"מ	FLUAZIFOP-P-BUTYL	1	אדמה מכתשים		5-10 ס"מ	50 סמ"ק		א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	0.1	0.06	0.06			
חץ סופר ת"מ	CLETHODIM	1	אדמה אגן	מעלה אמיתי ראשון	א"ה	70 - 100 סמ"ק	לדגנים רב שנתיים. לכתמים הריכוז הוא 1%. פירוט זנים ראה בתווית		0.5	1	1	1		
סלקט סופר ת"מ			לידור											
קולקט ת"מ			תפזול											
קליק ת"מ			אגרולב											

שם התכשיר	חומר פעיל	קבוצת פעילות	בעל הרשיון	שלב/גיל גידול	שלב/גיל עשב	מינון/ד' מרוסס או %	הערות	השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	שאריות מרביות מותרות (MRL)			
									ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב
טיטוס ג"ר	RIMSULFURON	2	גדות אגרו	לאחר קליטת השתילים	א"ה	5 - 10 גרם		א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	0.1	0.01*	0.01*	0.05
טיטניום ג"ר			תרסיס				בתוספת שטח 90 0.1%					
קלאודיוס ג"ר			גדות אגרו				בשילוב טיבולין. 96 ימי המתנה לפני קטיף.					
כרמל ג"ר	METRIBUZIN	5	גדות אגרו	א"ש, מ-4 עלים מפותחים	א"ה, עד 5 ס"מ	30 - 50 גרם	יישום לאחר ה-15 באפריל אך לא לפני הגיע צמח העגבניה לשלב של 4 עלים מפותחים		0.01	0.1*	0.1*	0.1
פייטון 70 ג"ר			אדמה אגן			25 גרם	יישום לאחר שהשתילים נקלטו והתבססו, לא מוקדם מ-10 ימים א"ש או לפני הגיע צמח העגבניה לשלב של 4 עלים אמיתיים					
מטרו ת"ר			תפזול			35 סמ"ק						
ליאופרד ת"מ	QUIZALOFOP-P-ETHYL	1	אדמה אגן		א"ה, לפני הגעה לפריחה	50-200 סמ"ק		א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	0.1	0.05	0.05	
מוניטור ג"ר	SULFOSULFURON	2	אדמה אגן	משבועיים א"ש	ק"ה/א"ה	5 - 8 גרם	פירוט זנים והוראות שימוש ראה בתוית	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	0.05	0.01*	0.01*	
סטאר ת"מ	OXADIAZON	14	תפזול	ק"ש	ק"ה/א"ה	350 סמ"ק	לפני ההמטרה הקודמת לשתילה	א. אירופי, ארה"ב	0.02	0.01*	0.05*	
רונסטאר ת"מ			גדות אגרו									
פוקוס אולטרא ת"מ	CYCLOXYDIM	1	אדמה אגן		א"ה	120 - 400 סמ"ק		ארה"ב	0.2	1.5	1.5	
צילנג' ת"ר	ACLONIFEN	34	גדות אגרו	ק"ש	ק"ה וא"ה	400 סמ"ק	3 שבועות לפחות לפני השתילה	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	0.02	0.01*	0.01*	
קדרה ת"נ	IMAZAPIC	2	לוכסמבורג	א"ש		2 סמ"ק	21 ימי המתנה לפני קטיף. להדברת עלקת. יישום ראשון 75 ימים משתילה, יישום שני 96 ימים משתילה. פירוט זנים ראה בתוית	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	0.1	0.01*	0.01*	