

16/7/2026

דף למגדל – תמונת מצב והמלצות

תירס

חלקות התירס בכרב שחור נמצאות בעיצומו של הקציר, ומהתרשמות ראשונית היבולים טובים. עם זאת, נצפית תופעה נרחבת של התייבשות מהירה, לעיתים עד כדי התמוטטות הצמחים. התופעה מופיעה במספר זנים ונצפתה גם באזור הצפון. בשלב זה הגורם אינו ברור, ונבדקים כיוונים שונים: מחלת קרקע, אקריות או מזיק אחר, תנאי אקלים, ואפשרות שהיבולים הגבוהים יוצרים דרישות הזנה מוגברות. מומלץ לעקוב מקרוב אחר קצב ההתייבשות לאחר סגירת המים בחלקה, ובהתאם לכך להתאים את מועד ותוכנית הקציר.

כותנה

ניכר פיגור בצבירת היבול, אך כמות אברי הפרי גדולה, ורוב החלקות נראות בריאות ומתפתחות בכיוון הנכון. הצמחים הגיעו לגודל מספק ולמספר קומות פרי שאין צורך או תועלת להוסיף עליו. האתגר כעת הוא לרסן את הצימוח הווגטיבי, ובמקביל להמשיך לספק לצמח את מלוא צרכיו.

בדיקות הפטורות מצביעות בעקביות על מחסור משמעותי בחנקן. הממצאים חוזרים במספר מעבדות ובחלקות רבות במשקים שונים, אף שהמחסור אינו ניכר לעין ולכן מעורר סימני שאלה. אנו ממשיכים לבחון את הסיבות האפשריות לכך.

מומלץ שלא להתעלם מהממצאים, ולשקול תוספת מתונה של יחידות חנקן מעבר לתוכנית המקורית, בגישת "כבדהו וחשדהו". במקביל, כדאי לבצע בדיקה חוזרת בתוך פרק זמן קצר.

בתחום המזיקים המצב שקט יחסית בשלב זה. נקווה שאין זה השקט שלפני הסערה.

אבטיח

כלל החלקות נמצאות לאחר סגירת המים ובתהליך הפלת הנוף.

לקראת המגוב, מומלץ להתחיל את העבודה בשעות הצהריים, כאשר הלחות יורדת והאבטיחים מתנתקים טוב יותר מה"לבש".

בחלקות מהזנים דניאלה וליטל, שבהן הנוף נפל במהירות או עוד לפני סגירת המים, מומלץ להזדרז בהוצאת הטפטוף ולהתקדם למגוב ולדיש. בחלקות שבהן הנוף עדיין מכסה את האבטיחים, קיים פחות חשש להתרככות מהירה של הקליפה הדקה.

בזנים יעקבי, אוריאל ומללי לא נצפתה רגישות מיוחדת של הקליפה במהלך המגוב והדיש. בחלקות שבהן יש שיעור גבוה של אבטיחים קטנים, מומלץ להגביר את לחץ המגוב.

צוות הדרכה

מגדלי הדרום